

AVERTISSEMENTS

AGRICOLES®

DLP 29-8-88036426

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION GRANDES CULTURES

ABONNEMENT ANNUEL:

REGISSEUR RECETTES D.R.A.F.

95 f



RÉGION RHÔNE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CÉDEX 03

19 Février 1986

N° de série continue 62

Bulletin n° 1

COLZA

CHARANÇON DE LA TIGE : placez vos pièges
GROSSE ALTISE : dernier contrôle

CHARANÇON DE LA TIGE et autres insectes du printemps

Le Service Régional de la Protection des Végétaux dispose d'un réseau de piégeage et vous tiendra informé des résultats de captures et des traitements correspondants.

Cependant, nous vous recommandons de placer vous-mêmes un piège, qui est d'un emploi simple, et qui peut vous indiquer rapidement l'arrivée des parasites.

Il est constitué d'une cuvette jaune contenant de l'eau additionnée d'un peu de mouillant fixée sur un piquet, sur lequel on la déplace en suivant le sommet de la végétation du colza. Ce piège est placé à une dizaine de mètres d'une bordure de parcelle, si possible située au voisinage d'un champ ayant eu un colza l'année précédente (voir au verso).

En effet, c'est à l'occasion de la migration des charançons de la tige vers les nouveaux champs de colza qu'ils sont capturés. Une fois sur place, ils se déplacent peu et ne se capturent plus : il est donc primordial de disposer le piège avant les premières invasions, qui, inaperçues, peuvent être à l'origine des dégâts les plus importants lorsqu'ils sont effectués sur une végétation venant de démarrer.


Nous vous conseillons donc d'installer le piège dès maintenant et de le visiter tous les jours dès la fin de la période froide et pluvieuse actuelle.

Contrôler également d'une façon précise la reprise de la végétation : elle indique le début de la sensibilité du colza au charançon de la tige.

GROSSE ALTISE DU COLZA

La campagne présente ne semble pas avoir été très favorable à ce ravageur. A ce jour, les interventions possibles ont normalement déjà été faites, ainsi que le contrôle des larves en hiver. Si cela n'était pas le cas, il est encore temps de faire une visite dans les parcelles et s'assurer que les pétioles des feuilles ne contiennent pas de galeries. Les larves ne font des dégâts qu'après la reprise de végétation, où il est alors trop tard pour intervenir. Se reporter à notre dernier Bulletin n° 14 du 5 Décembre 1985 qui détaille ce sujet.

FIXATION DE LA CUVETTE JAUNE



Pour faire coulisser, enlever la cuvette pour éviter que l'eau ne se renverse

